



RYCHLÝ ÚČINEK



ALKOHLOVÝ ROZTOK
K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ
ÚČINNÝ NA POLIOVIRUS
ČIRÁ I BARVENÁ FORMA

Softasept® N

RYCHLÁ DEZINFEKCE KŮŽE PŘED VÝKONY,
PŘEDEVŠÍM VPICHEM A PUNKCÍ



Softasept® N

ALKOHOLOVÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK PRO PŘEDOPERAČNÍ DEZINFEKCI KŮŽE PŘI MALÝCH I VELKÝCH CHIRURGICKÝCH ZÁKROCÍCH



Softasept® N je širokospektrální přípravek na dezinfekci kůže nejen s rychlým účinkem (15 s), ale i s dobrou penetrací zaručující dlouhý remanentní účinek. Softasept® N je určen na dezinfekci kůže před veškerými chirurgickými zákroky, punkcemi, injekcemi včetně vakcinací ve všech oblastech zdravotnictví, domácí péče, dialýz a lékařské praxe.

VLASTNOSTI:

- Široké spektrum účinnosti: baktericidní (včetně MRSA), tuberkulocidní, levurocidní, účinný na obalené (vč. HBV, HCV, HIV) i neobalené viry (rotavirus, poliovirus)
- Alkoholový roztok k okamžitému použití
- Rychlý účinek 15 s
- Rychle schnoucí
- Čirá i barevná forma
- Zalistováno u DGHM, VAH*

SLOŽENÍ:

100 g přípravku obsahuje:
ethanol 74,1 g (100%), 10,0 g 2-propanol, čištěnou vodu
Softasept® N barvený ještě obsahuje povidon K-30,
citric acid, Orange Yellow S /E110/ a Azorubine /E122/

Oblast použití	Expozice
Kůže s nízkým obsahem tukových žláz*	
- Před injekcemi a punkcemi	15 s
- Před punkcemi kloubů, pleny mozkové, operačního pole	60 s
Kůže bohatá na tukové žlázy*	2,5 min

NÁVOD K POUŽITÍ

- K dezinfekci používejte nezředěný roztok Softasept® N. Tampónem nasyceným přípravkem Softasept® N důkladně natírejte kůži operačního pole.
- Po doporučenou dobu expozice udržujte kůži dostatečně smočenou.
- Zabraňte tvorbě louží pod pacientem.
- Než použijete elektrické nástroje a přístroje musí dezinfekční přípravek na kůži úplně zaschnout, případně jeho výpary musí být odvětrány.

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI:

Účinnost	Metoda	Expozice
Dezinfekce kůže: - před vpichem - nízký / vysoký obsah tukových žláz	DGHM 13*	15 s 1 / 2,5 min
Baktericidní	EN 13727	15 s
Levurocidní (C. albicans)	EN 13624	15 s
Tuberkulocidní	EN 14348	15 s
Obalené viry	DVV/RKI*	15 s
Omezeně virucidní (obalené viry, Adenovirus, MNV)	EN 14476	30 s
Plně virucidní (obalené i neobalené viry)	EN 14476	60 s
Rotavirus	DVV/RKI*	60 s

Softasept® N - čirý	Katalog. č.
Lahvička s rozprašovačem 250 ml	19340
Láhev 1 000 ml	19342
Kanistr 5 l	19343

Softasept® N - barvený	Katalog. č.
Lahvička s rozprašovačem 250 ml	19344
Láhev 1 000 ml	19346
Kanistr 5 l	19347

Upozornění: Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

*
DVV – Německá společnost pro virová onemocnění
RKI – Institut Roberta Kocha, Německo
DGHM – Německá Společnost pro hygienu a mikrobiologii
VAH – Společnost aplikované hygieny