

Zriaďovacou listinou MZ SR č. [redacted]



PREPÚŠŤACIA SPRÁVA

Meno a priezvisko: [redacted] Rodné číslo: [redacted] Poistovňa: [redacted]
Bydlisko: [redacted]
Hospitalizovaný-á od: [redacted] 2014 do: [redacted] 2014 na [redacted]
od: [redacted] 2014 do: [redacted] 2014 na [redacted]
od: [redacted] 2014 do: [redacted] 2014 na [redacted]

Dôvod hospitalizácie: Pacientka prijatá pre absces v lôžku po cholecystektómii.

RA: Bez pozoruhodnosti

OA: DLP, st.p. OP hrubého čreva pre tumor, st.p. CHET; st.p. Laparotomia, revisio, cholecystectomy, biopsio lymphonodi lig. hepatoduodenale et MTS hepatitis [redacted] 2014 na II. chir. klinike, Ca confluensd. hepatici, MTS ad hepar multiplices - histol. dobre dif. adenokarcinóm t.č. CHET st.p. ERCP [redacted] 2014 s PST

LA: Torvacard ttbl. V, Essentiale F, Iagosa

AA: negat.

NA: 0 SA: [redacted]

EA: Sine GA: bp CA: 0

TO: pacientka [redacted] 2014 laparotomia, revisio, cholecystectomy, biopsio lymphonodi lig. hepatoduodenale et MTS hepatitis na našej klinike s perop. nálezom neresekabilného tumoru extrahepat. žlč. ciest, so záverom patológa adenokarcinóm extrahepat. - žlč. ciest, T.č.: asi 7 dní pozoruje febrilitu, je t.č. na CHET, na USG dg. susp. abscesové ložisko v lôžku po CHE.

Status praesens: Pri vedomí, orientovaná správne, poloha aktívna, habitus normostenický, koža antikterická, afebril., bez dušnosti a cyanózy, amening, orient. neurol. v norme.

Hlava: Mezocefalická, na poklop nebolestivá, inervácia hlavových nervov správna, oči - bulby v strednom postavení, skléry anikterické, FR bilat. výbavná, uši a nos bpn. DÚ: jazyk plazí v strede, vlhký, nepovlečený, orofarynx kludný

Krk: Súmerný, ŠŽ a LÚ nevz., ven. náplň krčných žíl nezvýšená. Šija voľná, neoponuje

Hrudník: Pulmo - dýchanie vezik., čisté, Cor- AS prav., ozvy zvučné, bez šelestu.

Brucho: v niveau hrudníka, voľné, mäkké, priehmatné, palpačne bolestivé v mieste jazvy po CHCE, kt. je indurovaná, koža v tomto mieste je teplá, brucho je bez defansu, peristaltika prítomná, hepar a lien nehmatné, tapott. bilat. negat.

Končatiny: symetrické, bez edémov, varixov a známkov flebitidy, perif. pulzácie bilat. hmatné

Hmotnosť: kg TK: 100/60 torr Pulz: 78 /min., prav. Teplota: 37,6 °C

Výsledky vyšetrení:

Klinická biochémia - výsledky

S-GLU 10.47 5.69 5.84 4.51 5.74 7.20 4.98 mmol/l, S-UREA 5.77 6.42 3.50 3.45 3.46 2.15 2.56 mmol/l, S-KREA 101.5 75.5 63.6 48.8 50.2 51.0 56.5 umol/l, S-KM 161.7 230.8 umol/l, S-CB 52.91 52.87 70.76 62.13 64.57 57.06 g/l, S-ALB 25.23 g/l, S-BILC 20.84 16.54 16.14 13.80 12.26 9.39 15.46 umol/l, S-AST 0.47 0.37 0.38 0.34 0.28 0.23 0.45 ukat/l, S-ALT 0.31 0.28 0.25 0.22 0.19 0.13 0.29 ukat/l, S-GMT 10.83 9.82 13.72 11.46 11.43 6.28 6.10 ukat/l, S-ALP 6.13 5.68 5.40 4.66 4.49 4.61 4.31 ukat/l, S-AMS 2.24 1.04 2.97 2.19 2.36 5.75 2.69 ukat/l, S-Na 122 127 138 135 132 129 128 mmol/l, S-K 3.41 4.55 4.56 4.21 3.94 3.89 4.44 mmol/l, S-Cl 88 97 97 98 97 96 94 mmol/l, S-Ca 2.17 2.24 mmol/l, S-CRP 246.28 254.07 12.22 15.49 47.61 21.12 <5 mg/l

Hematológia - výsledky

KO-WBC 19.23 10.79 10.34 6.95 8.43 10x9/l, KO-RBC 3.35 4.30 3.86 3.28 4.10 10x12/l, KO-HGB 110.00 137.00 113.00 104.00 125.00 g/l, KO-HCT 0.31 0.41 0.36 0.31 0.39, KO-PLT 156 634 410 385 379 10x9/l, KO-MCH 32.80 31.90 29.30 31.70 30.50 pg, KO-MCHC 359.00 337.00 310.00 339.00 321.00 g/l, KO-MCV 91.30 94.70 94.30 93.60 94.90 fl, KO-NEUabs 5.60 10x9/l, KO-LYMabs 2.33 10x9/l, KO-MONOab 0.42 10x9/l, KO-EOZabs 0.05 10x9/l, KO-BASOab 0.03 10x9/l, KO-NEU 68.4 %, KO-LYM 27.6 %, KO-MONO 5.0 %, KO-EOZ 0.6 %, KO-BASO 0.4 %, RDW 13.00 13.90 13.80 14.20 14.50 %, MPV 8.72 9.00 8.92 8.52 9.20 fl, PLT-Mi 630.00 10f9/L, PT-% 70.0 75.0 %, APTT-s 37.6 37.3 s, APTT-R 1.27 1.26, PT-INR 1.27 1.21

[redacted] 2014 USG dutiny brušnej

Pečeň - zväčšená, v lôžku po cholecystektómii sa zobrazuje neohraničený, nepravidelný, tekutinový, septovaný útvar zmiešanej echogenity s chobotovitými výbežkami do periférie veľkosti cca 13x6x4cm - z úsô obrazu sa jedná o abscesové ložisko. Presiaknutie tukového tkaniva a podkožia v okolí zápalového ložiska

Intrahepatálne žľčové cesty sú dilatované. Susp. aerobilia.

Pankreas - zobrazený nezväčšený, ostrých kontúr, homogénnej štruktúry, veku primeranej echogenity, bez ložiskových zmien. Slezina - mierne zväčšená, homogénnej, normoechogénnej štruktúry, bez evid.

Dátum/čas tlače : [redacted] 2014 [redacted]

Strana : 1 / 2

Meno a priezvisko :

Rodné číslo :

ložiskových zmien. Obličky - bilat. primeranej veľkosti, bez dilat. KPS, bez ložiskových zmien, šírka parenchýmu primeraná. MM je slabo naplnený, Paraaortokaválne priestory tienené. Bez prit. voľnej tekutiny v DB a v MP. Záver: St.p. CHCE- abscesové ložisko v lóžku, hepatosplenomegália, dilatácia žlčových ciest

ERCP+stent: Prístroj pod kontrolou obrazovky zavedený do D2. Papila je po drenáži prominuje DBD. Extrahujeme ho PE slučkou Po opätovnom zavedení prístroja sa snažíme o DBD zavádzame 10 Fr 12 cm drén úplne sa nám ho nepodarilo pretlačiť. Diagnostický záver: M. Klatskin Leak žlče som nevidel. Endoskopická terapia: Duodenobiliárna drenáž.

2014

Kultivácia: vyter z rany: Escherichia coli

Kvantitatívna citlivosť (MIC v mg/l) na antibiotika:

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| ampicilin..... | C 2,000 | cefoperazon/sulbactam..... | C 0,500 |
| ampicilin + sulbactam..... | C 2,000 | cefepime..... | C 0,250 |
| piperacilin + tazobacta.... | C 2,000 | ciprofloxacín..... | C 0,030 |
| tigecyclín..... | C 0,125 | kolimicin..... | C 1,000 |
| tetracyklín..... | C 1,000 | gentamicín..... | C 0,250 |
| trimetoprin/sulfonamid.... | C 0,125 | tobramycín..... | C 0,250 |
| cefuroxim..... | C 4,000 | amikacín..... | C 1,000 |
| cefotaxim..... | C 0,250 | ertapenem..... | C 0,030 |
| ceftazidim..... | C 0,250 | meropenem..... | C 0,250 |

Terapia: 0,9% SODIUM CHL. IN W.F.I.FRESE, 2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM, 5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECT, AMINOVEN 10 %, AXETINE 1,5 G, FRAXIPARINE, HARTMANN'S SOLUTION BP FRESNIU, METRONIDAZOL B. BRAUN 5 MG/ML, NOVALGIN 500 MG/1 ML, PLASMALYTE, TEVAZOL 20 MG

Operácia: 2014 odd:CHIR anestéza: 1. Bez špec. ž.1 C Celková

K83.1 Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest/Klatskinov tumor/Abscessus cavi abdominis et abscessus in cicatricae post chol

Výkon: Laparotómia, revisio, evacuatio pus, drainage c. abdominis Výkon: Laparotómia, revisio, evacuatio pus, drainage c. abdominis Operatér

Epikríza: Pacientka s inresekabilným Klatskinovým TU a st. po CHE (7/2014). Aktuálne prijatá pre absces v operačnej rane. Prevedená laparotómia s evakuáciou abscesu a drenážou dutiny brušnej. Počas hospitalizácie realizované aj ERCP so snahou o rednáz stenotického úseku žlčových ciest pri Klatskinov TU nálezom vid' vyššie. Z drénu prerváva žlčová sekrécia, preto ho skrácujeme a ponechávame. Rana čistá granulovaná, prevezovaná, hojí sa per secundam. V deň emisie pacientka ťažkosti neudáva. Prepustená v stabilizovanom stave do ambulantnej starostlivosti.

Diagnózy: Abscessus cavi abdominis et abscessus in cicatricae post cholecystectomia
Klatskinov tumor

Obštrukcia žlčových ciest
MTS ad hepar multiples - histol. dobre dif. adenokarcinóm
St.p. resekcií hrubého čreva pre CA s adj. CHT
Dyslipoproteinémia

Odporúčanie: Šetriaci režim, prevazy op. rany (poučená). Chronická medikamentózna liečba ako doteraz, preventívne Fraxiparine. Dispenzár onkológom. Do 3 dní KO u obv. lekára.

Pacient (alebo jeho zákonný zástupca) svojim podpisom potvrdzuje, že pri prepustení z ústavnej starostlivosti:

- bol riadne poučený o liečebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe,
- ošetrojúci lekár mu poskytol potrebné lieky na 3 dni nasledujúce po prepustení z ústavnej starostlivosti,
- prevzal lekársku prepúšťaciu správu, ktorú je povinný do 3 dní doručiť svojmu všeobecnému lekárovi.

Pacient (alebo jeho zákonný zástupca) prehlasuje, že tomuto poučeniu porozumel v celom rozsahu.

podpis pacienta (alebo zákonného zástupcu)

Dátum/čas tlače : 2014

Strana : 2 / 2



Email:

Ambulantný nález

Ambulantný nález

Pacient:

ZP:

Rôdňé číslo:

Číslo poistenca:

Trvalé bydlisko:

Krvná skupina pacienta:

2014

Terajšie ochorenie:

Vymenili sme cievku. Pre PSA 155 je vysoké suspícium na malignitu prostaty.

Pacientovi som navrhol bioptické vyš., prostaty, odmietol ho.

Výmeny cievky v mesačných intervaloch, zberné vrecká.

Záver:

Dg.: N40 Hyperplázia prostaty (predstojnicé)

Zapsal: MUDr. 2014

OPERAČNÝ PROTOKOL

Pacient: [REDACTED] Rodné číslo: [REDACTED] Poistovňa: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Č. chorobopisu: [REDACTED] Dátum a čas príjmu: [REDACTED] 2014 [REDACTED]

Operatér: [REDACTED]

nštrumentár: [REDACTED]

Anestéziológ: [REDACTED]

Anestézia: celková

Operácia: [REDACTED] 2014 [REDACTED]

Druh: ORL - plánovaná

Diagnóza: C04.0, Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny

Výkony: 050100-operácie na nose, ústach a laryngu

Nález: Dg.: Tu baseos oris I.dx.

Op.: Panendoskopia, resectio Tu baseos oris, laser

V celk. anest. zavedený rigidný bronchoskopický tubus pre dospelých, trachea voľná, prstence vykreslené, tracheálna karína ostrá, hlavné bronchy voľné. Zavedená priama Hopkinsova optika, hlavné a segmentálne bronchy v dosahu teleskopu voľné, bez zjavných tumor. zmien. Pacientka zaintubovaná. Zavedený ezofagoskopický tubus pre dospelých, vchod do pažeráka voľný, sliznica pažeráka kludná, v dist. tretine mierne začervenalá, krkvy vyznačené, v lumen žal. šťava až do 35cm od horného zuboradia. Zavedený Kleinsasserov tubus pre dospelých, epiglotis štíhla, konfigur., vestib. riasy hladké, ventrikuly voľné, hlasivky bledé, rovné, hladké. Glosopiglot. vlekuly voľné, pirif. recesy voľné, sliznica hladká. Koreň jazyka palp. mäkký, bez zjavných TU zmien. tonsily v oblúkoch, palp. bez zjavnej rezistencie, makroskop. bez TU zmien. Sublinguálne vpravo je drobný Tu sliznice do 1,5 cm plazivý. Priebeh výkonu bez komplikácií.

po založení rozvierača úst sa pokračuje resekciou tu spodiny ústnej laserom s resekčným okrajom cca 1,5 cm, ad histol., spodina makroskop. negat., dorzálny resekčný okraj ako hraničné tkanivo tiež na histol., sutura sliznice ku okrajom., hemostáza, založená NGS.

Histológia: odoslaná [REDACTED]

Dátum: [REDACTED] 2014



Zriaďovacou listinou MZ SR č. 48/2000 Z.z. z 12. 10. 2000



Operačný nález

Pacient : [redacted] Poistovňa: [redacted]
Narodený: [redacted] Bydlisko: [redacted]

Dátum operácie : [redacted] 2014 Por.č.: [redacted] Začiatok: 00:00 Koniec: 00:00
Anestéza : [redacted] Sestra: [redacted]
Operatér : [redacted] Sestra: [redacted]
Asistent : [redacted] Ročné č.op.: [redacted]


Anestéza : Celková - Inhalačná
Diagnózy : , ()
Operačné výkony :

Pacientka po preklade z inf kliniky pre mechanický ileus pri stenotizujúcom tu rekta indikovaná do op. programu

Strednou laparotómiou prenikáme do dutiny brušnej potom ju predlžujeme proxim aj distálne. V dutine berušnej je ascitický výpotok. dist polovica tenkého čreva a celé hrubé črevo je výrazne dilatované.revidujeme dutinu brušnú mts na pečeni ani na omente neachádzame hmatný tu rekta. rozhodujeme sa pre sigmostómiu.uvoľňujeme colon descendens aj lienálnu flexúru pomocou Ligasure.po príprave vykonávame nástennúcolostomiu podľa Maydla.Do Douglasovho priestoru zavádzame drén a po toalata a kontrole krvácaniu dutinu brušnú uzatvárame v anatom vrstvách.

Dop.: Analgetiká parenterálna výživa ATB Fraxiparine 0,4 ml. s.c.

[redacted]



Dátum a čas tlače: [redacted]



Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1847/1990 A/1 z 22. júna 1990



II. Chirurgická klinika -RA - [redacted]

Operačný nález

Pacient : [redacted] Poistovňa: [redacted]

Narodený: [redacted] Bydlisko: [redacted]

Dátum operácie : [redacted] 2014 Por.č.: [redacted] Začiatok: [redacted] Koniec: [redacted]

Anestéza : [redacted] Sestra: [redacted]

Operatér : [redacted] Sestra: [redacted]

Asistent : [redacted] Ročné č.op.: [redacted]

Anestéza : Celková - Bez špec. č.1


Diagnózy : K83.1, Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest/Klatskinov tumor/Abscessus cavi abdominis et abscesus in cicatricae post chol (OPE)

Operačné výkony : Laparotomia, revisio, evacuatio pus, drainage c. abdominis
Laparotomia, revisio, evacuatio pus, drainage c. abdominis

Indikácia: spetické teploty a absces v ložku po žlčníku a v podkoží v jazve po cholecystectomii je indikáciou na chir. liečbu

V celkovej anestéze rezom v starej jazve po operácii žlčníka sa postupne dostávame do podkožia a na fasciu. Pod tlakom vystrekuje zapachajúci hnis žltavo hnedej farby. Odobratá K+C včetně anaerobov. Postupne uvoľňujeme fasciu a prstom sa dostávame do dutiny brušnej. Nachádzame abscesové ložisko v mieste po ložku žlčníka. Evakuujeme hnis a prstom rozrušujeme septá. Smerom distálnym pod pr. lalokom pečene hnis už neprítomný. Abscesvu dutinu drenujeme PVC drenom a subhepatalnu oblasť preplachovým drenom. Situačna sutura fascie. Do podkožia Betadinová longeta. Na kožu jeden steh v prostriedku.

Na odd.: ATB, Dolsin 100 mg i.m. pri bolesti, Fraxiparin



Dátum a čas tlače: [redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
Adresa: [REDACTED]

ZP: [REDACTED]

CT vyšetrenie abdomenu a m.p. + MPR, nat., i.v. KL:

Hepar mierne zväčšený, homogenny, primeranej denzity, v S8, 4 a S2 prítomné veľké cystické ložisko 12,5cm x 8 cm x 10cm ostro ohraničené, tenkostenné, bez sépt- nalieha na telo a hlavičku pankreasu a komprimuje oblasť porta hepatis, menšiu septovanú satelitnú cystu v S8 veľ. 1,9cm, v S6 veľ. 0,6cm, v S7 veľ. 0,5cm. Mierna dilatácia intrahepatálnych žlč. ciest ľ. laloka heparu - S3. Veľká cysta nalieha na priebeh hlavných intrahep. žlč. ciest pre ľ. lalok. Bez trombózy v. portae.

Cholecysta tenkostenná, hypodenzná, dekonfigurovaná. Ductus hepatocholedochus bez dilatácie.

Slezina nezväčšená, homogénna, bez ložiskových zmien.

Pankreas ohraničený, homogenny, lobulizovaný, bez TU ložiskových zmien, d. pancreaticus v úrovni hlavy do šírky 2mm. V úrovni D2 duodena prítomný oválny solidný TU proces mediálnej steny duodena s nasadením na oblasť Vaterskej papily prominujúci intraluminálne veľ. 30mm s centrálnym kalcifikátom veľ. 7mm. TU výrazne enhancuje, je ostro ohraničený s expanzívnym rastom.

Obličky topoanatomicky uložené, bez malígnych TU ložiskových zmien parenchýmu, parapancreatické cyszy ľ. obličky veľ. do 15mm, bez dilatácie KPS.

Nadobličky v norme bez MTS.

Bez zväčšených LU v dutine brušnej /DB/, retroperitoneu a malej panve. Bez mezenterálnej LAP. Divertikulóza hrubého čreva.

Bez prítomnosti voľnej tekutiny v CD a DB.

Nástenný trombus ektatickej abd. aorty - dolnej a strednej tretiny subrenálneho úseku, v axiálnych rezoch polmesiacovitého tvaru, nasadajúceho na dorzálnu a ľ. stenu aorty, s obrazom zúženia aorty na šírku lúmenu 11x13mm - susp. starý intramurálny hematóm aorty.

Záver: Gigantická cysta heparu, dopor. punciu pod CT kontrolou.

Neuroendokrinný tumor - NET D2 duodena nasadajúci na Vaterskú papilu.

[REDACTED]
[REDACTED]